

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya ibu dalam memberikan rehidrasi oral pada balita yang mengalami diare di wilayah kerja puskesmas wajak, dapat diambil kesimpulan:

##### **5.1.1 Responden 1 : Ny.E**

Upaya yang dilakukan Ny.E dalam memberikan rehidrasi oral pada anaknya yang mengalami diare cukup baik serta mampu memberikan rehidrasi oral. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Ny.E, yang memberikan larutan gula garam pada anaknya meskipun belum sesuai dosis serta segera membawa anaknya ke Puskesmas Wajak. Selain itu anak juga tetap diberikan makan walau anak agak sulit untuk makan, serta menjaga kebersihan anaknya dengan mengajarkan anaknya mencuci tangan.

##### **5.1.2 Responden 2 : Ny. F**

Upaya yang dilakukan Ny.F dalam memberikan rehidrasi oral pada anaknya yang mengalami diare cukup baik serta mampu memberikan rehidrasi oral dan obat Zinkid Zinc, tetap memberikan susu formula serta tetap memberikan makan pada anaknya meskipun anaknya sulit untuk makan, namun tidak membawa anaknya untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang ada. Namun untuk kebersihan pampes anak kurang diperhatikan.

#### **5.2 Saran**

##### **5.2.1 Bagi Puskesmas Wajak**

Peneliti memberikan saran bagi koordinator poli anak yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penanganan pada balita sakit dengan cara lebih meningkatkan penyuluhan di Puskesmas maupun

penyuluhan di posyandu balita, mengenai penanganan awal pada balita sakit, serta memberikan sediaan oralit di puskesmas untuk balita diare. Agar seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Wajak dapat melakukan upaya penanganan awal yang tepat bila ada balita yang sakit.

**5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebaiknya peneliti selanjutnya lebih memfokuskan mengenai penanganan pada balita sakit seperti gambaran pengetahuan ibu dalam penanganan awal pada balita diare.

**5.2.3 Bagi Responden**

Diharapkan bagi responden dapat memberikan penanganan awal pada balita diare dengan cepat dan tepat, serta segera membawa anaknya untuk berobat ke fasilitas kesehatan dan segera memberikan oralit pada anaknya yang mengalami diare.