

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada perbedaan yang bermakna sebelum dan sesudah pemberian makanan tambahan modifikasi pada tingkat konsumsi energi balita pada α 0,05.
2. Tidak ada perbedaan yang bermakna sebelum dan sesudah pemberian makanan tambahan modifikasi pada tingkat konsumsi protein balita pada α 0,05.
3. Ada perbedaan yang bermakna terhadap berat badan balita sebelum dan sesudah pemberian makanan tambahan modifikasi dengan indeks status gizi BB/U pada balita pada α 0,05

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. PMT balita modifikasi dapat membantu meningkatkan status gizi pada balita dan mengoptimalkan program PMT yang ada.
2. Diperlukan pengembangan modifikasi penyajian MT Balita yang menarik secara visual dan dapat menghilangkan rasa serta aroma yang khas dari biskuit MT Balita.
3. Diperlukan pengembangan modifikasi penyajian MT Balita yang lebih padat gizi sehingga dapat meminimalkan jumlah yang dimakan balita dalam satu hari.