BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah tindakan hemodialisa pada pasien gagal ginjal kronis adalah sebagai berikut:

1. Tekanan Darah Sebelum Hemodialisa

Tekanan darah sistole sebelum dilakukan tindakan HD memiliki nilai mean yaitu 153,77 mmHg dengan nilai minimumnya adalah 107 mmHg dan maksimumnya adalah 193 mmHg. Sedangkan pada tekanan darah diastole sebelum dilakukan tindakan HD memiliki nilai mean yaitu 86,67 mmHg dengan nilai minimumnya adalah 63 mmHg dan maksimumnya adalah 111 mmHg.

2. Tekanan Darah Sesudah Hemodialisa

Tekanan darah sistole sesudah dilakukan tindakan HD memiliki nilai mean yaitu 163,97 mmHg dengan nilai minimumnya adalah 104 mmHg dan maksimumnya adalah 194 mmHg. Sedangkan pada tekanan darah diastole sesudah dilakukan tindakan HD memiliki nilai mean yaitu 88,50 mmHg dengan nilai minimumnya adalah 65 mmHg dan maksimumnya adalah 110 mmHg.

3. Perbedaan Tekanan Darah Antara Sebelum Dan Sesudah Hemodialisa Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik

- 1) H_0 diterima atau terdapat perbedaan antara tekanan darah sistole sebelum dilakukan tindakan HD dan tekanan darah sistole sesudah dilakukan tindakan HD dengan nilai signifikansi $0,017 < 0,05$.
- 2) H_0 ditolak atau tidak ada perbedaan tekanan darah diastole sebelum dilakukan tindakan HD dan tekanan darah diastole sesudah dilakukan tindakan HD dengan nilai signifikansi $0,389 > 0,05$.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini adalah:

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan bagi Institusi agar memperbanyak waktu praktik kerja di ruang HD bagi mahasiswa baik dalam kunjungan ke rumah sakit maupun dengan Praktek Kerja Lapangan.

2. Bagi Reponden

Diharapkan bagi para responden agar lebih aktif dalam mencari informasi tentang perubahan-perubahan apa saja yang dapat terjadi sebelum dan sesudah hemodialisa

3. Bagi Perawat Ruang HD

Diharapkan bagi perawat ruang HD agar dapat mencegah terjadinya perubahan tekanan darah yang signifikan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi yang lebih parah.

4. Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang akan datang dengan menambahkan besaran sampel, atau menambah uji korelasi antara data demografi dengan tekanan darah.