

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hubungan antara pemberian cairan *preloading* dengan kejadian hipotensi intraoperatif pada pasien bedah mayor dengan *spinal* anestesi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mayoritas responden diberikan *preloading* sebanyak 26 responden (60,5%) dari total 43 responden.
2. Mayoritas responden mengalami hipotensi intraoperatif sebanyak 23 responden (53,5%) dari total 43 responden. Dari 26 responden yang diberikan *preloading*, sebanyak 9 responden mengalami hipotensi intraoperatif.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian cairan *preloading* dengan kejadian hipotensi intraoperatif pada pasien bedah mayor dengan *spinal* anestesi dengan nilai *p-value* sebesar $0,004 < 0,05$.

5.2 Saran

5.2.1. Bagi Institusi Layanan Kesehatan

Dengan penelitian, bagi institusi praktisi kesehatan khususnya perawat anestesi diharapkan dapat memperhatikan pemberian asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian cairan *preloading* bagi pasien bedah mayor dengan *spinal* anestesi.

5.2.2. Bagi Instansi Pendidikan Keperawatan

Dengan penelitian ini, bagi instansi pendidikan keperawatan dan koleksi di perpustakaan Poltekkes Kemenkes Malang agar dapat memperbanyak referensi seputar keperawatan perioperatif, sehingga dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa dalam penyusunan karya tulis dalam bidang keperawatan perioperatif.

5.2.3. Penelitian Selanjutnya

Dalam mengembangkan penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memperhatikan kecukupan dan memastikan bahwa cairan preloading diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien dan kondisi klinis pasien tanpa memengaruhi keputusan dari paramedis lainnya.