

ABSTRAK

Winarsih, Elina Putri Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Rendahnya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Puskesmas Kendalsari. Skripsi. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pembimbing I : Sri Rahayu, S.Kep.Ns., M.Kes. Pembimbing II : Endah Kamila M., SST., M.Keb

Kontrasepsi adalah upaya mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Metode kontrasepsi terdiri dari metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Non MKJP. Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012 (Susenas, 2012) memperlihatkan data penggunaan alat kontrasepsi Provinsi Jawa Timur menunjukkan masih didominasi Non-MKJP dibandingkan penggunaan MKJP. Puskesmas Kendalsari merupakan salah satu Puskesmas di kota Malang yang memiliki jumlah akseptor KB Non MKJP sebanyak 85,7% dan akseptor KB MKJP sebanyak 14,3%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya penggunaan MKJP pada PUS di Puskesmas Kendalsari Kota Malang. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini seluruh PUS yang ada di puskesmas Kendalsari sebanyak 44 orang dan seluruhnya dijadikan sampel. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil olah data didapatkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yaitu faktor usia dengan nilai p (0.008), agama dengan nilai p (0.023), sosial budaya dengan nilai p (0.044), dan paritas dengan nilai p (0.001). Dari beberapa faktor predisposisi, pendukung dan penguat tersebut faktor usia, sosial budaya, agama dan paritas memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melatarbelakangi rendahnya penggunaan MKJP pada PUS di Puskesmas Kendalsari.

Kata kunci : faktor-faktor, MKJP, PUS

ABSTRACT

Winarsih, Putri Elina Factors Associated with Low Long-Term Use of Contraception Method (LTM) On Couple Of Childbearing Age In Kendalsari Health Center. Essay. Midwifery Degree Program Applied Malang, Department of Malang Health Polytechnic. Supervisor I: Sri Rahayu, S.Kep.Ns., Kes. Supervisor II: Endah Kamila M., SST., M.Keb

Contraception is an effort to prevent pregnancy as a result of a meeting between the egg with the sperm cells. Contraceptive methods consist of long-term contraceptive method (LTM) and Non LTM. National Social Economic Survey in 2012 (IDHS 2012) shows data on the use of contraceptives East Java province show still dominated than the use of Non-LTM. Kendalsari Health Center is one of the health centers in the city of Malang that has a number of family planning acceptors Non LTM as much as 85.7% and acceptors LTM as much as 14, 3%. The purpose of this study was to determine the factors that cause low usage on couple of childbearing age at the health center LTM Kendalsari Malang. This study was descriptive correlational. The population in this study the whole couple of childbearing age at puskesmas Kendalsari many as 44 people and completely sampled. This study used a questionnaire instrument. Based on the results if the data showed that the factors associated with low use of long-term contraceptive method that is a factor of age with a p-value (0.008), a religion with a p-value (0.023), social culture with a p-value (0.044)And parity with p(0001), From some predisposing, enabling and reinforcing the factors of age, socio-cultural, religious and parity have a higher tendency in the underlying low use of LTM on couple of childbearing age in Kendalsari health center.

Keywords: factors, LTM, Couple Of Childbearing Age